

- Скарлато О. А., Старобогатов Я. И. Филогенетика и принципы построения естественной системы.— В кн.: Теоретические вопросы систематики и филогении животных. Л.: Наука, 1974, с. 30—46.
- Татаринов Л. П. Морфологическая эволюция териодонтов и общие вопросы филогенетики.— М.: Наука, 1976.— 258 с.
- Шмальгаузен И. И. Кибернетические вопросы биологии.— Новосибирск: Наука, 1968.— 224 с.
- Эпштейн В. М. Изучение филогенетических преобразований формы тела пиявок из сем. Piscicolidae методом математического моделирования.— В кн.: IX конф. Укр. паразитол. о-ва. Киев: Наук. думка, 1980, ч. 4, с. 191—192.
- Эпштейн В. М. Изучение жизненных форм пиявок методом математического моделирования.— В кн.: IV съезд Всес. гидробиол. о-ва. Киев: Наук. думка, 1981, ч. 4, с. 213—215.
- Эпштейн В. М., Шелева С. М. Методика изучения формы тела рыбных пиявок.— В кн.: Краткие тез. докл. II Всесоюз. симпозиума по паразитам и болезням морских животных. Калининград, 1976, с. 79—80.

ТИНРО

Получено 27.08.84

ЗАМЕТКИ

Rhyarioides metelkana (Lederer, 1861) (Lepidoptera, Arctiidae) в Сибири. 6 ♂, 3 ♀ *R. metelkana* L.d. пойманы на свет у оз. Кротовая Ляга в окр. Карасука Новосибирской обл. 18—21.06.1977 (В. Дубатов), 16.06.1980 (С. Никитина), 25.06.1982 (А. Баркалов). Этот болотно-озерный вид впервые обнаружен на территории Западной Сибири. Ранее был известен из Сев. Франции, Венгрии, СССР: Херсонщины, Приазовья (Таганрог, Ростовская обл.), Приамурья, Приморья, Кореи, Японии (Seitz, 1913; Алфераки, 1908; Шелюшко, 1941). В последние годы найден на небольших озерах в окр. Берлина, ГДР (Naeger, 1973), на западе Румынии и в дельте Дуная (König, 1978). В коллекции Зоологического института АН СССР, Ленинград, обнаружены экземпляры из новых мест: Дербент, Дагестанская АССР и бухта Абрек на Мал. Шантарских о-вах, Охотское море.— В. В. Дубатов (Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск).

Малоизвестные клопы фауны СССР. *Eumecotarsus milidius* Seidenstücker—Азербайджанская ССР, Кусарский р-н, 12.06.1950, Богачев, *Anthocoris amplicollis* Horváth—♀, Армянская ССР, Воротан, 6.09.1956, Тряпицын (колл. Зоологического института АН СССР); большое количество имаго и личинок старших возрастов, Азербайджанская ССР, Алты-Агач, на *Fraxinus excelsior*, 10—11.07.1981, 12—13.07.1982, Дражолюк.— И. С. Драполюк (Институт зоологии АН АзССР, Баку).

Обнаружение Arcosoma dicorniger (Hsiung) (Ciliophora, Suctorina) на Украине. Названный вид обнаружен 16.02.1984 в экскрементах одной из 50 обследованных лошадей, поступивших на Киевский ипподром из Лозовского конезавода. На территории СССР этот редкий вид щупальцевых инфузорий отмечался ранее у лошадей в Ленинградской обл. и на о. Путьтин (А. А. Стрелков—Уч. зап./Ленингр. педин-т, 1939, 17, вып. 7:131.— И. В. Довгаль, А. Н. Пиндрус (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР, Киев).

Обнаружение нематоды Dioctophyme renale у каспийского тюленя. В феврале 1984 г. у одного из 52 тюленей, добытых в районе о. Огурчинский (северная часть Каспийского моря), обнаружен самец 4-й стадии *D. renale* Collet-Meygret, 1915. Паразит прошивал серозный и мышечный слои толстой кишки, так что передний и задний концы выступали в полость тела. В месте внедрения на поверхности кишки наблюдалось местное кровоизлияние площадью около 2 см². Длина обнаруженной личинки 63 мм. Вокруг ротового отверстия расположены два круга папилл, по 6 в каждом. Нервное кольцо расположено в 0,13 мм от переднего конца тела. Ранее в полости тела каспийского тюленя из района п-ва Мангышлак была обнаружена неполовозрелая нематода, определенная как *Dioctophyme* sp. (И. Г. Щупаков, Уч. зап./Ленингр. ун-т. Сер. биол., № 7, вып. 3: 140).— В. Н. Попов, И. М. Тайков (Симферопольский университет им. М. В. Фрунзе).